

# Kæmpebjørneklo

## *Heracleum mantegazzianum*



### Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Den blomstrende plante er 3-5 meter høj med op til 2 meter høje blade og mere end 1 meter brede skærme. Bladede er stærkt fligede og spidse. Alle dele af den modne plante er tæt besat af gennem-sigtige hår.

### Kan planten forveksles med andre?

Kan forveksles med andre store skærmpflanter som kvan, almindelig bjørneklo og angelik.

### Mere viden om kæmpebjørneklo

Om kæmpebjørneklo ved vi, at:

- Den i Danmark er 2-10 år, før den blomstrer
- Den dør efter blomstring
- Den formerer sig ved spredning af frøene også via vand
- Den kaster mere end 10.000 frø, ca. 5% af frøene spirer
- Blade med rodknold kan spire på våd bund
- Den tåler utallige afskæringer af blade
- Roden dør ved korrekt rodstikning

Det betyder, at kæmpebjørneklo først og fremmest skal forhindres i at blomstre og sætte frø. Fra omkring 1. juni er det tydeligt, om en forekomst vil blomstre, da stængler med store blomsterknopper begynder at vokse frem.

### Hvorfor bekæmpe kæmpebjørneklo?

Kæmpebjørneklo skygger den naturlige vegetation og mindsker derved biodiversiteten af både dyr og planter. Kæmpebjørneklo er en indført plante, der betragtes som invasiv.

Ud over dette er planten giftig, hvis man kommer i berøring med saften eller hårene, der sidder på stænglen.

### Beskyttelse og udstyr

Bjørneklosaft kan – i forbindelse med sollys, give blære og udslet på huden, der minder om en kraftig forbrænding. Derfor skal man ved enhver kontakt med planten have kraftige og helst langskafte handsker på. Lange ærmer og benklæder er absolut nødvendigt ved rodstikning, skærmpkning og ved kemisk bekæmpelse. Ved skærmpkning skal man desuden bære hjelm med visir samt vandtætbe-kledning. Åndedrætsværn er ikke nødvendigt.

Hav rigeligt med vand og sæbe med ud, så berørte hudpartier kan vaskes, hvis uheldet skulle være ude og dæk det berørte hudparti, så det ikke får sol! Pas på ikke at gnide øjne med saftindsmurte handsker.

### Skal jeg bekæmpe kæmpebjørneklo?

I Ringsted Kommune har du pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvilket fremgår af kommunens indsatsplan på området. Indsatsplanen for Ringsted Kommune kan ses på kommunens hjemmeside.



Kæmpebjørneklo med blomsterknop på vej



## Hvordan bekæmpes kæmpebjørneklo?

Der er flere bekæmpelsesmetoder. Vælg den metode, der passer til bestandens størrelse og alderssammensætning samt drift af arealet (fx beskyttet natur).

Det vil typisk tage flere år at bekæmpe en bestand fuldstændig.

### Mange planter (flere end 1000)

**Afgræsning**, kan anvendes hvis det er muligt at hegne arealet, de fleste racer af får spiser gerne kæmpebjørneklo, også mange kreaturer spiser planten.

**Afdækning**, arealet kan afdækkes med kraftigt plast eller kraftige presninger. Afdækningen skal fastgøres og tilses efter blæst. Afdækningen skal ligge i flere år.

**Sprøjtning**, kan anvendes til bekæmpelse og kræver sprøjtecertifikat. Vær opmærksom på åbent vand og beskyttet natur.

**Skærmpkning**, kan være effektivt på både store og små bestande, men kræver en del og er den metode, hvor der er størst risiko for at få saft på sig.



Stor og spredt bestand af kæmpebjørneklo

### Mindre bestande og enkelte planter

**Rodstikning**, foregår med en almindelig spade. Ved at skære plantens rod over under vækstpunktet dør den. Vækstpunktet ligger typisk lige under jordoverfladen, så det er normalt tilstrækkeligt at rodstikke planten i 2-3 cm's dybde. Rodstikning kan foregå i hele vækstsæsonen, men arbejdet er lettest enten om foråret, eller når planterne er små. Hvis roden ikke skæres i vækstpunktet, vokser planten videre.

### Det vigtigst er efterkontrol

Uanset metode skal der altid tjekkes efterfølgende, da der kan spire nye planter og større planter kan danne nye blomster (panikblomster).

### Gode hjemmesider

Hvis du vil vide mere:

Miljøstyrelsen, [mst.dk](http://mst.dk), [Haveselskabet.dk](http://Haveselskabet.dk) og på [youtube](https://www.youtube.com/).



Rod af kæmpebjørneklo